

Coupes de Chvátal-Gomory

Pierre Bonami

M06 - 2010-2011

22 janvier 2012

Première partie I

Coupes de Chvátal-Gomory

Rappels : Algorithme de plans coupants

On considère un programme en nombres entiers **pur** :

$$\begin{aligned} \max \quad & cx \\ & Ax \leq b \\ & x \geq 0 \\ & x \in \mathbb{Z}^n \end{aligned}$$

Algorithme

1. $\mathcal{C} \leftarrow \emptyset$
2. Résoudre la relaxation continue
 $\max\{cx : Ax \leq b, \alpha x \leq \beta, \forall \alpha, \beta \in \mathcal{C}, x \geq 0\}$. Soit \hat{x} la solution.
3. Si $\hat{x} \in \mathbb{Z}^n$ FIN.
4. Trouver $\alpha x \leq \beta$ tel que $\alpha \hat{x} > \beta$ et $\alpha x \leq \beta$ pour tout $x \in \mathbb{Z}^n$ tel que $Ax \leq b$ et $x \geq 0$.
5. Ajouter α, β à \mathcal{C} et aller en 2.

Rappels : Inégalités valides

Soit X un sous-ensemble de \mathbb{R}^n .

Inégalité valide

Une inégalité $\alpha x \leq \beta$ est dite valide pour X si $\alpha x \leq \beta$ pour tout $x \in X$.

Problème de séparation

Étant donné $\hat{x} \in \mathbb{R}^n$ trouver une inégalité valide pour X telle que $\alpha \hat{x} > \beta$.

Théorème

Soit $P = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax \leq b\}$ un polyèdre non vide. Toutes les inégalités valides pour P sont de la forme $u^T Ax \leq \beta$ où $u \geq 0 \in \mathbb{R}^m$ et $\beta \geq u^T b$.

(conséquence directe du Lemme de Farkas)

Un principe de coupe

Un principe simple


Si $x \in \mathbb{Z}$ et $x \leq f$ $f \notin \mathbb{Z}$ alors $x \leq \lfloor f \rfloor$ où $\lfloor f \rfloor$ est la partie entière de f .

Utilisation

Soit une inégalité $\alpha x \leq \beta$ telle que $\alpha_i \in \mathbb{Z}$ $i = 1, \dots, n$. Si x satisfait l'inégalité et x est entier $\alpha x \leq \lfloor \beta \rfloor$.

Exemple

$x \in \mathbb{Z}^2$ tel que $x_1 + x_2 \leq 1.9$



Un principe de coupe

Un principe simple


Si $x \in \mathbb{Z}$ et $x \leq f$ $f \notin \mathbb{Z}$ alors $x \leq \lfloor f \rfloor$ où $\lfloor f \rfloor$ est la partie entière de f .

Utilisation

Soit une inégalité $\alpha x \leq \beta$ telle que $\alpha_i \in \mathbb{Z}$ $i = 1, \dots, n$. Si x satisfait l'inégalité et x est entier $\alpha x \leq \lfloor \beta \rfloor$.

Exemple

$x \in \mathbb{Z}^2$ tel que $x_1 + x_2 \leq 1.9$



Un principe de coupe

Un principe simple


Si $x \in \mathbb{Z}$ et $x \leq f$ $f \notin \mathbb{Z}$ alors $x \leq \lfloor f \rfloor$ où $\lfloor f \rfloor$ est la partie entière de f .

Utilisation

Soit une inégalité $\alpha x \leq \beta$ telle que $\alpha_i \in \mathbb{Z}$ $i = 1, \dots, n$. Si x satisfait l'inégalité et x est entier $\alpha x \leq \lfloor \beta \rfloor$.

Exemple

$x \in \mathbb{Z}^2$ tel que $x_1 + x_2 \leq 1.9 \Rightarrow x_1 + x_2 \leq \lfloor 1.9 \rfloor = 1$



Coupes de Chvátal-Gomory

Théorème


Si $x \in \mathbb{Z}^n$ vérifie $Ax \leq b$, l'inégalité $uAx \leq \lfloor ub \rfloor$ est valide pour tout $u \geq 0$ tel que $uA \in \mathbb{Z}^m$.

Exemple

On considère le polyèdre donné par les inégalités :

$$x_1 + x_2 \leq 2$$

$$3x_1 + x_2 \leq 5$$



Coupes de Chvátal-Gomory

Théorème


Si $x \in \mathbb{Z}^n$ vérifie $Ax \leq b$, l'inégalité $uAx \leq \lfloor ub \rfloor$ est valide pour tout $u \geq 0$ tel que $uA \in \mathbb{Z}^m$.

Exemple

On considère le polyèdre donné par les inégalités :

$$x_1 + x_2 \leq 2$$

$$3x_1 + x_2 \leq 5$$



Coupes de Chvátal-Gomory

Théorème

Si $x \in \mathbb{Z}^n$ vérifie $Ax \leq b$, l'inégalité $uAx \leq \lfloor ub \rfloor$ est valide pour tout $u \geq 0$ tel que $uA \in \mathbb{Z}^m$.

Exemple


On considère le polyèdre donné par les inégalités :

$$x_1 + x_2 \leq 2$$

$$3x_1 + x_2 \leq 5$$

En prenant $u_1 = u_2 = 1/2$:

$$2x_1 + x_2 \leq 3.5$$



Coupes de Chvátal-Gomory

Théorème

Si $x \in \mathbb{Z}^n$ vérifie $Ax \leq b$, l'inégalité $uAx \leq \lfloor ub \rfloor$ est valide pour tout $u \geq 0$ tel que $uA \in \mathbb{Z}^m$.

Exemple

On considère le polyèdre donné par les inégalités :

$$x_1 + x_2 \leq 2$$


$$3x_1 + x_2 \leq 5$$

En prenant $u_1 = u_2 = 1/2$:

$$2x_1 + x_2 \leq 3.5$$

En arrondissant on obtient :

$$2x_1 + x_2 \leq 3$$



Fermeture élémentaire

Définition

Soient $P := \{x \in \mathbb{R}^n : Ax \leq b\}$ et $X = P \cap \mathbb{Z}^n$, on appelle fermeture élémentaire de Chvátal l'ensemble :

$$P^{(1)}(P) = \{x \in \mathbb{R}^n : uAx \leq \lfloor ub \rfloor, \text{ pour tout } u \geq 0 \text{ tel que } uA \in \mathbb{Z}^n\}.$$

Proposition

$$X \subseteq P^{(1)}(P) \subseteq P$$

Application récursive

On peut appliquer récursivement la procédure :

$$P^{(2)}(P) = P^{(1)}(P^{(1)}(P))$$

$$\vdots$$

$$P^{(k)}(P) = P^{(1)}(P^{(k-1)}(P))$$

Théorème de Chvátal-Gomory

Théorème

Soit A une matrice à coefficients rationnelles et b un vecteur à coefficients rationnelles. Toute inégalité valide pour X peut être obtenue par un nombre fini d'application de la procédure de Chvátal.

(i.e. $\text{conv}(X) = P^k(X)$ pour k fini).

Exemple


$$\max 9x_1 + 5x_2$$

$$x_1 \leq 6 \quad u_1$$

$$-x_1 + 3x_2 \leq -1 \quad u_2$$

$$3x_1 + 2x_2 \leq 19 \quad u_3$$

$$x \in \mathbb{Z}_+^2$$



Théorème de Chvátal-Gomory

Théorème

Soit A une matrice à coefficients rationnelles et b un vecteur à coefficients rationnelles. Toute inégalité valide pour X peut être obtenue par un nombre fini d'application de la procédure de Chvátal.

(i.e. $\text{conv}(X) = P^k(X)$ pour k fini).

Exemple


$$\max 9x_1 + 5x_2$$

$$x_1 \leq 6 \quad u_1$$

$$-x_1 + 3x_2 \leq -1 \quad u_2$$

$$3x_1 + 2x_2 \leq 19 \quad u_3$$

$$x \in \mathbb{Z}_+^2$$



Théorème de Chvátal-Gomory

Théorème

Soit A une matrice à coefficients rationnelles et b un vecteur à coefficients rationnelles. Toute inégalité valide pour X peut être obtenue par un nombre fini d'application de la procédure de Chvátal.

(i.e. $\text{conv}(X) = P^k(X)$ pour k fini).

Exemple


$$\max 9x_1 + 5x_2$$

$$x_1 \leq 6 \quad u_1$$

$$-x_1 + 3x_2 \leq -1 \quad u_2$$

$$3x_1 + 2x_2 \leq 19 \quad u_3$$

$$x \in \mathbb{Z}_+^2$$



$$u_1 = 0, u_2 = 3/11, u_3 = 1/11$$

Théorème de Chvátal-Gomory

Théorème

Soit A une matrice à coefficients rationnelles et b un vecteur à coefficients rationnelles. Toute inégalité valide pour X peut être obtenue par un nombre fini d'application de la procédure de Chvátal.

(i.e. $\text{conv}(X) = P^k(X)$ pour k fini).

Exemple


$$\max 9x_1 + 5x_2$$

$$x_1 \leq 6 \quad u_1$$

$$-x_1 + 3x_2 \leq -1 \quad u_2$$

$$3x_1 + 2x_2 \leq 19 \quad u_3$$

$$x \in \mathbb{Z}_+^2$$



$$u_1 = 0, u_2 = 3/11, u_3 = 1/11 \Rightarrow x_1 \leq 1 \quad (u_4)$$

Théorème de Chvátal-Gomory

Théorème

Soit A une matrice à coefficients rationnelles et b un vecteur à coefficients rationnelles. Toute inégalité valide pour X peut être obtenue par un nombre fini d'application de la procédure de Chvátal.

(i.e. $\text{conv}(X) = P^k(X)$ pour k fini).

Exemple


$$\max 9x_1 + 5x_2$$

$$x_1 \leq 6 \quad u_1$$

$$-x_1 + 3x_2 \leq -1 \quad u_2$$

$$3x_1 + 2x_2 \leq 19 \quad u_3$$

$$x \in \mathbb{Z}_+^2$$



$$u_1 = 0, u_2 = 3/11, u_3 = 1/11 \Rightarrow x_1 \leq 1 \quad (u_4)$$

Théorème de Chvátal-Gomory

Théorème

Soit A une matrice à coefficients rationnelles et b un vecteur à coefficients rationnelles. Toute inégalité valide pour X peut être obtenue par un nombre fini d'application de la procédure de Chvátal.

(i.e. $\text{conv}(X) = P^k(X)$ pour k fini).

Exemple


$$\max 9x_1 + 5x_2$$

$$x_1 \leq 6 \quad u_1$$

$$-x_1 + 3x_2 \leq -1 \quad u_2$$

$$3x_1 + 2x_2 \leq 19 \quad u_3$$

$$x \in \mathbb{Z}_+^2$$



$$u_1 = 0, u_2 = 3/11, u_3 = 1/11 \Rightarrow x_1 \leq 1 \quad (u_4)$$

Retour aux plans coupants

Algorithme

1. $\mathcal{C} \leftarrow \emptyset$
2. Résoudre la relaxation continue
 $\max\{cx : Ax \leq b, \alpha x \leq \beta, \forall \alpha, \beta \in \mathcal{C}, x \geq 0\}$. Soit \hat{x} la solution.
3. Si $\hat{x} \in \mathbb{Z}^n$ FIN.
4. Trouver $\alpha x \leq \beta$ tel que $\alpha \hat{x} > \beta$ et $\alpha x \leq \beta$ pour tout $x \in \mathbb{Z}^n$ tel que $Ax \leq b$ et $x \geq 0$.
5. Ajouter α, β à \mathcal{C} et aller en 2.

On suppose A à coefficients entiers.

Résolution de la relaxation continue

Le programme linéaire est mis sous forme standard (par l'ajout de variables d'écart) :

$$\begin{aligned} \max \quad & cx \\ & A'x' = b \\ & x' \geq 0 \\ & x' \in \mathbb{Z}^{n+m} \end{aligned}$$

et résolu par la méthode du simplexe.

A l'optimum de la relaxation continue, on a une base B et un tableau du simplexe :

$$x'_B + B^{-1}Nx'_N = B^{-1}b$$

où N est la matrice des variables hors base, et la solution optimale \hat{x} est donnée par $\hat{x}_N = 0$ et $\hat{x}_B = B^{-1}b$. On note $\bar{A} = B^{-1}A'$ et $\bar{a}_0 = B^{-1}b$.

Une ligne du tableau est de la forme :

$$x'_i + \sum_{j \notin B} \bar{a}_{ij}x'_j = \bar{a}_{i0}$$

Si $\bar{a}_0 \in \mathbb{Z}^m$ la solution optimale de la relaxation continue est entière (FIN). Sinon, il existe i tel que $\bar{a}_{i0} \notin \mathbb{Z}$

Séparation d'une coupe de Gomory

$$x'_i + \sum_{j \notin B} \bar{a}_{ij} x'_j = \bar{a}_{i0}$$

On note $f_j = \bar{a}_{ij} - \lfloor \bar{a}_{ij} \rfloor$

$$x'_i + \sum_{j \notin B} f_j x'_j + \sum_{j \notin B} \lfloor \bar{a}_{ij} \rfloor x'_j = \bar{a}_{i0}$$

Comme $x'_j \geq 0$ et $f_j \geq 0$, cette égalité implique ;

$$x'_i + \sum_{j \notin B} \lfloor \bar{a}_{ij} \rfloor x'_j \leq \bar{a}_{i0}$$

Le membre de gauche est entier, on peut arrondir celui de droite :

$$x'_i + \sum_{j \notin B} \lfloor \bar{a}_{ij} \rfloor x'_j \leq \lfloor \bar{a}_{i0} \rfloor$$

Séparation d'une coupe de Gomory (II)

L'inégalité

$$x'_i + \sum_{j \notin B} [\bar{a}_{ij}] x'_j \leq [\bar{a}_{i0}]$$

n'est pas satisfaite par la solution courante : $\hat{x}'_i = \bar{a}_{i0}$ et $\hat{x}'_j = 0$
pour $j \notin B$ donc :

$$\hat{x}'_i + \sum_{j \notin B} [\bar{a}_{ij}] \hat{x}'_j = \bar{a}_{i0} > [\bar{a}_{i0}]$$

On peut donc ajouter cette inégalité et appliquer l'algorithme de séparation.

Algorithme de Gomory

On suppose A à coefficients entiers.

1. $\mathcal{C} \leftarrow \emptyset$
2. Résoudre la relaxation continue
 $\max\{cx : Ax \leq b, \alpha x \leq \beta, \forall \alpha, \beta \in \mathcal{C}, x \geq 0\}$, par l'algorithme du simplexe. Soit \hat{x} la solution et B la base optimale.
3. Si $\hat{x} \in \mathbb{Z}^n$ FIN.
4. Choisir une ligne du tableau :

$$x'_i + \sum_{j \notin B} \bar{a}_{ij} x'_j = \bar{a}_{i0}$$

telle que $\bar{a}_{i0} \notin \mathbb{Z}$.

5. Ajouter l'inégalité de Gomory

$$x'_i + \sum_{j \notin B} \lfloor \bar{a}_{ij} \rfloor x'_j \leq \lfloor \bar{a}_{i0} \rfloor$$

et aller en 2.

Finitude de l'algorithme

Solution lexicographiquement minimale

Une solution \hat{x} est dite lexicographiquement optimale si :

- ▶ elle est optimale ;
- ▶ elle est minimale dans l'ordre lexicographique : toute autre solution optimale \bar{x} est telle que

$$\hat{x}_1 < \bar{x}_1 \text{ ou } (\hat{x}_1 = \bar{x}_1 \text{ et } \hat{x}_2 < \bar{x}_2) \text{ ou } \dots$$

$$\text{ou } (\hat{x}_i = \bar{x}_i \text{ pour } i = 1, \dots, n-1 \text{ et } \hat{x}_n < \bar{x}_n)$$

Théorème de Gomory

L'algorithme converge en temps fini si la relaxation continue est résolue à une solution lexicographiquement optimale à chaque itération.

Remarques

- ▶ L'algorithme de Gomory a été découvert en 1958.

Remarques


- ▶ L'algorithme de Gomory a été découvert en 1958.
- ▶ Très vite (1960 ?) il a été considéré comme inutile en pratique : mauvaise convergence, numériquement instable. . .

Remarques

- ▶ L'algorithme de Gomory a été découvert en 1958.
- ▶ Très vite (1960 ?) il a été considéré comme inutile en pratique : mauvaise convergence, numériquement instable. . .
- ▶ En 2008 !! [Zanette, Balas et Fischetti](#) ont (re)découvert que l'algorithme original de Gomory ne marchait pas si mal.
- ▶ En 2010, [Z.B.F.](#) donnent comme exemple un problème posé par Knuth en 1960 avec 51 variables et 43 contraintes résolu pour la première fois en 1995 avec CPLEX.
 - ▶ Par branch-and-cut, le problème est résolu en 6 secondes et 91 000 nœuds.
 - ▶ L'algorithme de Gomory (légèrement modifié) résout le problème en 0,15 secondes avec 1 032 coupes !

Importance de l'ordre lexicographique

- ▶ Gomory (et le reste du monde) pensait que l'ordre lexicographique était une technicité théorique uniquement nécessaire pour la preuve.
- ▶ En fait, il joue un ordre capital en pratique.



Deuxième partie II

Coupes de Gomory Mixtes

Coupes mixtes de Gomory

Les coupes de Gomory peuvent uniquement être utilisées pour un problème en nombres entiers pur.

Nous considérons maintenant un problème mixte :

$$\max cx$$

$$Ax \leq b$$

$$x \geq 0$$

$$x_i \in \mathbb{Z} \quad i \in I \subseteq \{1, \dots, n\}$$

Principe disjonctif

Un principe simple

Si $x \in \mathbb{R}^n$, $x \geq 0$ et x satisfait soit la contrainte $\sum_{i=1}^n a_i^1 x_i \geq 1$ soit la contrainte $\sum_{i=1}^n a_i^2 x_i \geq 1$. Alors x satisfait la contrainte :

$$\sum_{i=1}^n \max\{a_i^1, a_i^2\} x_i \geq 1$$


Exemple

Si $x \geq 0$ satisfait soit

$$\frac{x_1}{2} + \frac{x_2}{2} \geq 1$$

soit

$$\frac{3}{5}x_1 + \frac{x_2}{5} \geq 1$$



Principe disjonctif

Un principe simple

Si $x \in \mathbb{R}^n$, $x \geq 0$ et x satisfait soit la contrainte $\sum_{i=1}^n a_i^1 x_i \geq 1$ soit la contrainte $\sum_{i=1}^n a_i^2 x_i \geq 1$. Alors x satisfait la contrainte :

$$\sum_{i=1}^n \max\{a_i^1, a_i^2\} x_i \geq 1$$


Exemple

Si $x \geq 0$ satisfait soit

$$\frac{x_1}{2} + \frac{x_2}{2} \geq 1$$

soit

$$\frac{3}{5}x_1 + \frac{x_2}{5} \geq 1$$



Principe disjonctif

Un principe simple

Si $x \in \mathbb{R}^n$, $x \geq 0$ et x satisfait soit la contrainte $\sum_{i=1}^n a_i^1 x_i \geq 1$ soit la contrainte $\sum_{i=1}^n a_i^2 x_i \geq 1$. Alors x satisfait la contrainte :

$$\sum_{i=1}^n \max\{a_i^1, a_i^2\} x_i \geq 1$$


Exemple

Si $x \geq 0$ satisfait soit

$$\frac{x_1}{2} + \frac{x_2}{2} \geq 1$$

soit

$$\frac{3}{5}x_1 + \frac{x_2}{5} \geq 1$$



Principe disjonctif

Un principe simple

Si $x \in \mathbb{R}^n$, $x \geq 0$ et x satisfait soit la contrainte $\sum_{i=1}^n a_i^1 x_i \geq 1$ soit la contrainte $\sum_{i=1}^n a_i^2 x_i \geq 1$. Alors x satisfait la contrainte :

$$\sum_{i=1}^n \max\{a_i^1, a_i^2\} x_i \geq 1$$


Exemple

Si $x \geq 0$ satisfait soit

$$\frac{x_1}{2} + \frac{x_2}{2} \geq 1$$

soit

$$\frac{3}{5}x_1 + \frac{x_2}{5} \geq 1$$



Principe disjonctif

Un principe simple

Si $x \in \mathbb{R}^n$, $x \geq 0$ et x satisfait soit la contrainte $\sum_{i=1}^n a_i^1 x_i \geq 1$ soit la contrainte $\sum_{i=1}^n a_i^2 x_i \geq 1$. Alors x satisfait la contrainte :

$$\sum_{i=1}^n \max\{a_i^1, a_i^2\} x_i \geq 1$$

Exemple

Si $x \geq 0$ satisfait soit


$$\frac{x_1}{2} + \frac{x_2}{2} \geq 1$$

soit

$$\frac{3}{5}x_1 + \frac{x_2}{5} \geq 1$$

il satisfait :

$$\frac{3}{5}x_1 + \frac{x_2}{2} \geq 1$$



Dérivation d'une coupe mixte simple

On considère toujours une ligne du tableau (maintenant certaines variables sont continues) correspondant à une variable de base entière ($x'_i \in \mathbb{Z}$) :

$$x'_i + \sum_{j \notin B} \bar{a}_{ij} x'_j = \bar{a}_{i0}$$

Soit $f_0 = \bar{a}_{i0} - \lfloor \bar{a}_{i0} \rfloor$. On réécrit la ligne :

$$\sum_{j \notin B} \bar{a}_{ij} x'_j - f_0 = \lfloor \bar{a}_{i0} \rfloor - x'_i$$

Comme $\lfloor \bar{a}_{i0} \rfloor - x'_i \in \mathbb{Z}$ on a soit $\lfloor \bar{a}_{i0} \rfloor - x'_i \geq 0$ soit $\lfloor \bar{a}_{i0} \rfloor - x'_i \leq -1$ et donc soit

$$\sum_{j \notin B} \bar{a}_{ij} x'_j - f_0 \geq 0$$

soit

$$\sum_{j \notin B} \bar{a}_{ij} x'_j - f_0 \leq -1.$$

Dérivation d'une coupe mixte simple (II)

En réarrangeant les termes, soit

$$\sum_{j \notin B} \bar{a}_{ij} x'_j \geq f_0$$

soit

$$\sum_{j \notin B} \bar{a}_{ij} x'_j \leq f_0 - 1.$$

On divise la première inégalité par $f_0 > 0$ et la seconde par $f_0 - 1 < 0$, soit

$$\sum_{j \notin B} \frac{\bar{a}_{ij}}{f_0} x'_j \geq 1$$

soit

$$\sum_{j \notin B} \frac{\bar{a}_{ij}}{f_0 - 1} x'_j \geq 1.$$

On peut maintenant appliquer le principe disjonctif, on obtient :

$$\sum_{j \notin B} \max\left\{\frac{\bar{a}_{ij}}{f_0}, \frac{\bar{a}_{ij}}{f_0 - 1}\right\} x'_j \geq 1.$$

Remarque

Comme $f_0 > 0$ et $f_0 - 1 < 0$:

$$\max\left\{\frac{\bar{a}_{ij}}{f_0}, \frac{\bar{a}_{ij}}{f_0 - 1}\right\} = \begin{cases} \frac{\bar{a}_{ij}}{f_0} & \text{si } \bar{a}_{ij} > 0 \\ \frac{\bar{a}_{ij}}{f_0 - 1} & \text{si } \bar{a}_{ij} < 0. \end{cases}$$

et l'inégalité s'écrit :

$$\sum_{j \notin B, \bar{a}_{ij} > 0} \frac{\bar{a}_{ij}}{f_0} x'_j + \sum_{j \notin B, \bar{a}_{ij} < 0} \frac{\bar{a}_{ij}}{1 - f_0} x'_j \geq 1.$$

Une meilleure inégalité : Inégalité Mixte de Gomory

Au début de la dérivation on peut améliorer l'inégalité en différenciant les variables hors bases entières et continues dans la ligne du tableau :

$$x'_i + \sum_{j \notin B, j \in I} \bar{a}_{ij} x'_j + \sum_{j \notin B, j \notin I} \bar{a}_{ij} x'_j = \bar{a}_{i0}$$

Soit $f_0 = \bar{a}_{i0} - \lfloor \bar{a}_{i0} \rfloor$, $f_j = \bar{a}_{ij} - \lfloor \bar{a}_{ij} \rfloor$. La ligne peut se réécrire :

$$x'_i + \sum_{j \notin B, j \in I, f_j \leq f_0} f_j x'_j + \sum_{j \notin B, j \in I, f_j > f_0} (1 - f_j) x'_j + \sum_{j \notin B, j \notin I} \bar{a}_{ij} x'_j = \bar{a}_{i0} - x'_i - \sum_{j \notin B, j \in I, f_j \leq f_0} \lfloor \bar{a}_{ij} \rfloor x'_j - \sum_{j \notin B, j \in I, f_j > f_0} \lceil \bar{a}_{ij} \rceil x'_j \quad (1)$$

En utilisant l'intégrité du membre de droite on peut dériver une coupe de la même manière, on obtient :

$$\sum_{j \notin B, j \in I, f_j \leq f_0} \frac{f_j}{f_0} x'_j + \sum_{j \notin B, j \in I, f_j > f_0} \frac{1 - f_j}{1 - f_0} x'_j + \sum_{j \notin B, j \notin I, \bar{a}_{ij} > 0} \frac{\bar{a}_{ij}}{f_0} x'_j + \sum_{j \notin B, j \notin I, \bar{a}_{ij} < 0} \frac{\bar{a}_{ij}}{1 - f_0} x'_j \geq 1.$$

Comparaison des coupes de Gomory pures et Mixtes

Si on suppose le problème entier, on peut montrer que l'inégalité mixte

$$\sum_{j \notin B, f_j \leq f_0} \frac{f_j}{f_0} x'_j + \sum_{j \notin B, f_j > f_0} \frac{1 - f_j}{1 - f_0} x'_j \geq 1.$$

domine l'inégalité pure :

$$x'_i + \sum_{j \notin B} [\bar{a}_{ij}] x'_j \leq [\bar{a}_{i0}].$$

Remarques

Pour les programmes mixtes, l'algorithme de Gomory ne converge pas en temps fini.

En 1996, il a été découvert que l'algorithme pouvait en fait être utile dans le cadre d'un branch-and-cut.

Algorithme de renforcement

1. Résoudre la relaxation continue
 $\max\{cx : Ax \leq b, \alpha x \leq \beta, \forall \alpha, \beta \in \mathcal{C}, x \geq 0\}$. Soit \hat{x} la solution et B la base optimale.
2. Si $\hat{x} \in \mathbb{Z}^n$ FIN.
3. Pour toute les lignes du tableau :

$$x'_i + \sum_{j \notin B} \bar{a}_{ij} x'_j = \bar{a}_{i0}$$

telles que $\bar{a}_{i0} \notin \mathbb{Z}$, ajouter l'inégalité Mixte de Gomory et aller en 2.

Ces coupes sont intégrées dans tous les solveurs modernes (CPLEX, GUROBI, GLPK, COIN-OR, ...).